

農技第 1708 号
令和 8 年 10 月 5 日

関係各位

兵庫県病虫害防除所長

令和 8 年度病虫害発生予報第 6 号を発表します。

令和 8 年度病虫害発生予報第 6 号

向こう 1 か月の病虫害発生予想

作物名	病虫害名	発生予想	発生現況
冬キャベツ	菌核病	平年並	平年並
冬レタス	菌核病	平年並	平年並
野菜等共通	ヨトウガ	平年並	平年並
	ハスモンヨトウ	やや多	やや多
	シロイチモジヨトウ	多	やや多
	オオタバコガ	やや多	平年並
	ハイマダラノメイガ	平年並	平年並
果樹等共通	果樹カメムシ類	やや多	やや多


太文字の病虫害: 向こう 1 か月の間、発生状況に特に注意を要する病虫害を示す。

* 気象の概況

近畿地方 1 か月予報
(10月3日から11月2日までの天候見通し)

令和8年10月1日
大阪管区气象台 発表

<予想される向こう1か月の天候>



* 発生概況及び防除対策上の留意点

根拠中の記号

- (+) : 発生量を多くする要因
- (-) : 発生量を少なくする要因
- (±) : 発生量が平年並になる要因

冬キャベツ

1 【菌核病】

- (1) 予想：発生量 平年並
- (2) 根拠：発生現況 平年並（発生見られず）（-）
気象予報 気温は高い（-）
降水量は少ない（-）

冬レタス

1 【菌核病】

- (1) 予想：発生量 平年並
- (2) 根拠：発生現況 平年並（発生見られず）（-）
気象予報 気温は高い（-）
降水量は少ない（-）

野菜等共通

1 【ヨトウガ】

- (1) 予想：発生量 平年並
- (2) 根拠：発生現況 フェロモントラップへの誘殺数はやや多～やや少（±）
気象予報 気温は高い（+）

2 【ハスモンヨトウ】

- (1) 予想：発生量 **やや多**
- (2) 根拠：発生現況 **やや多**（+）
大豆における発生現況は平年並（±）
フェロモントラップへの誘殺数は多～平年並（+）
気象予報 気温は高い（+）

(3) 防除上の留意点

- ア 本種の幼虫は、キャベツ、レタスをはじめ多くの野菜類を加害する。
- イ 卵塊や集団でいる若齢幼虫を見つけたらすみやかに捕殺する。
- ウ 中齢以降の幼虫には、薬剤による防除効果が低くなるので、早期発見に努め、若齢幼虫期の防除を徹底する。
- エ 薬剤防除は、病虫害・雑草防除指導指針、地域の防除暦等を参考に薬剤を選定し、農薬使用基準を守る。薬剤抵抗性回避のため、異なる作用機構の薬剤をローテーション散布する。

3 【シロイチモジヨトウ】

- (1) 予想：発生量 **多**
- (2) 根拠：発生現況 **やや多 (+)**
フェロモントラップへの誘殺数は多～やや多 (+)
気象予報 気温は高い (+)
降水量は太平洋側で少ない、日本海側で平年並～少ない (+)

(3) 防除上の留意点

- ア 本種の加害植物は、ネギ、キャベツ、ピーマンをはじめ多くの野菜類のほか、豆類、花き類など広い範囲に及ぶ。
- イ 本種は茎葉の柔らかい部分を好んで食害する性質があり、定植直後の被害には特に注意する。
- ウ 薬剤防除を行う場合は、病虫害・雑草防除指導指針、防除情報等を参考に薬剤を選定し、農薬使用基準を守る。
- エ 防除についての詳細は令和8年度病虫害発生予察注意報第2号（令和8年9月15日発出、<https://bojo.hyogo-nourinsuisangc.jp/archives/1718>）を参考とする。

4 【オオタバコガ】

- (1) 予想：発生量 **やや多**
- (2) 根拠：発生現況 平年並 (±)
フェロモントラップへの誘殺数は多 (+)
気象予報 気温は高い (+)
降水量は太平洋側で少ない、日本海側で平年並～少ない (+)

(3) 防除上の留意点

- ア 本種の加害植物は、キャベツ、レタス、ピーマンをはじめ多くの野菜類のほか、花き類など広い範囲に及ぶ。
- イ 果実や花蕾に穿入した幼虫及び中齢以降の幼虫には、薬剤による防除効果が低くなるので、早期発見に努め、若齢幼虫期の防除を徹底する。
- ウ 成虫の産卵、飛来防止による防除手法として、防虫ネット、黄色灯、性フェロモン製剤がある。
- エ 薬剤防除は、病虫害・雑草防除指導指針、地域の防除暦等を参考に薬剤を選定し、農薬使用基準を守る。薬剤抵抗性回避のため、異なる作用機構の薬剤をローテーション散布する。
- オ 防除についての詳細は令和8年度病虫害発生予察防除情報第5号（令和8年9月25日発出、<https://bojo.hyogo-nourinsuisangc.jp/archives/1729>）を参考とする。

5 【ハイマダラノメイガ】

- (1) 予想：発生量 平年並
- (2) 根拠：発生現況 誘致植物*（クレオメ）での発生量は平年並 (±)

気象予報 気温は高い（＋）

降水量は太平洋側で少ない、日本海側で平年並～少ない
（＋）

＊対象とする害虫が好む植物で、発生状況を調査するために用いられる。

果樹等共通

1 【果樹カメムシ類】

（１）予想：発生量 **やや多**

（２）根拠：発生現況 予察灯、フェロモントラップへの誘殺数は多～平年並（＋）

気象予報 気温は高い（＋）

その他 チャバネアオカメムシ等果樹を加害するカメムシ類の発生
量には隔年性があり、本年は発生が多い年に該当する。

（３）防除上の留意点

ア 飛来状況は地域や園地で異なるため、定期的に園を見回り、飛来状況の把握
に努める。袋かけをしても、果実が肥大して袋に接すると、被害を受ける
ことがあるので注意する。

イ 発生や被害を認めたら速やかに防除する。

ウ 薬剤散布を行う場合は、病虫害・雑草防除指導指針等を参考に薬剤を選定し、
農薬使用基準を守る。

エ 防除についての詳細は令和８年度病虫害発生予察注意報第１号（令和８年５
月２０日発出、<https://bojo.hyogo-nourinsuisangc.jp/archives/1621>）、同防
除情報第４号（令和８年８月２８日発出、
<https://bojo.hyogo-nourinsuisangc.jp/archives/1695>）を参考とする。

防除にあたっては病虫害・雑草防除指導指針の内容のほか、兵庫県総合防除計画
を参照してください。

＊兵庫県総合防除計画は以下のURLに掲載

<https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk09/sougouboujyo.html>

＊病虫害・雑草防除指導指針 農薬の検索は以下のURLに掲載

<https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/noyakusearch/hyogo>

＊病虫害・雑草防除指導指針 参考資料は以下のURLに掲載

<https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/hyogo>

＊この情報は、兵庫県病虫害防除所ホームページに掲載しています。

<https://bojo.hyogo-nourinsuisangc.jp/>

兵庫県病虫害防除所 ０７９０－４７－１２２２

「兵庫県病虫害防除所」X(旧Twitter)にて情報発信中。
発生予察情報など病虫害に関する情報をいち早く
提供しますので、フォローをお願いします。
Xアカウント (https://x.com/hyogo_boujoshou)

